

四川薹花属一新种

张 泽 荣

ONE NEW SPECIES OF WIKSTROEMIA ENDL. FROM SICHUAN

Chang Che-yung

会东薹花 新种 图

Wikstroemia huidongensis C. Y. Chang, sp. nov.

Affinis *W. lamatsoensi* Hamaya, a qua foliis basi plerumque rotundatis non amplexicaulibus, petiolis circa 1mm longis vel brevissimis, pedunculis 7—10mm longis, 3—7-floribus, disco ovarium subaequant, ovariis plerumque glabris differt.

Frutex sempervirens, circa 1—2m altus, praeter gemmas minutas albo-pilosas glaberrimus, ramulis juvenilibus viridescens, vetustis purpureo-brunneis, cicatricibus foliorum prominentibus, leviter semiorbiculatis, Folia ad apicem ramulorum confertiora, opposita, coriacea vel tenuiter coriacea, ovalia vel subrotundata, 2—3cm longa et 1—2cm lata, apice rotundata, raro obtusiuscula, saepe apiculata, basi rotundata raro obtusiuscula, non semiamplexicaulia, margine integerrima, leviter revoluta, supra atro-viridia, subtus pallidiora, nervis lateralibus utrinsecus 5—6, gracilibus, utrinque paulo conspicuis, petioli circa 1mm longi vel subnulli. Spicae terminales, breviores simplices, pedun-

本文作者工作单位: 四川, 成都, 四川大学生物系 (Department of Biology, Sichuan University, Chengdu, Sichuan).

culis 7—10mm longis, 3—7-floribus, pedicellis brevioribus, 0.5—1mm longis, flores lutei, tubus calycis longe cylindricus, 8—10mm longus, circa 1mm diam., extus glaber, lobis calycis 5, oblongis, circa 2mm longis, apice rotundatis vel truncatis, margine erosis; stamina 10, biseriata, inferiora supra medium tubi inserta, superiora infra faucem tubi inserta, exserta, antheris luteis, longe oblongis, circa 1.8mm longis, subsessilibus, squamula disci unica linearis, circa 1.8mm longa, apice bipartita usque ad medium; ovarium leviter cylindricum, 2mm longum, estipitatum, glabrum vel apice interdum paulo pilosum, stylo brevissimo, stigmate globoso, papilloso, Fructus desiccatur.

Sichuan: Huidong Xian, Yan-ba, alt. 2400m, frutex 1—2m alt., flores lutei, 23. Jun. 1959, S. K. Wu 1546 (Typus! CDBI).

常绿灌木，高约 1—2 米，全株除幼芽被白色柔毛外，其余无毛，幼枝淡绿色，老枝紫褐色，叶迹明显隆起，近半圆形。叶对生，较密的排列在小枝上部，革质或近革质，广椭圆形或近圆形，长 2—3 厘米，宽 1—2 厘米，顶端圆形，稍稍钝形，常具尖头，基部圆形，稍稍钝形，边缘全缘，微反卷，上面深绿色，下面淡绿色，侧脉 5—6 对，纤细，两面均略明显，或上面比下面明显；叶柄长约 1 毫米，或近于无柄。花黄色，顶生单一的穗状花序，具 3—7 花，总花梗长 7—10 毫米，花梗较短，长 0.5—1 毫米；花萼筒长圆筒形，长 8—10 毫米，直径约 1 毫米，外面无毛，裂片 5，，矩圆形，长约 2 毫米，顶端圆或截形，边缘微具缺刻；雄蕊 10，2 轮，下轮着生于花萼筒的中部以上，上轮着生于花萼筒的喉部，花药伸出喉部，黄色；长矩圆形，长约 1.8 毫米，花丝极短；花盘鳞片 1 枚，线形，长约 1.8 毫米，顶端通常 2 裂至中部；子房近圆柱形，长 2 毫米，无子房柄，无毛，稀顶端微被柔毛，花柱短，柱头圆球形，具细乳突。果实未见。

四川：会东县，岩坝，老青山，海拔 2000 米，灌木高 1—2 米，花黄色，1959 年 6 月 23 日，武素功 1546（模式标本！藏成都生物研究所植物标本室）。

本新种与金丝桃堇花 *W. lamatsoensis* Hamaya 很相近，但叶具长约 1 毫米的叶柄或近于无柄，叶片基部通常圆形，不包茎，总花梗长 7—10 毫米，花序仅具 3—7 花，花盘几乎与子房等长，子房通常无毛，稀顶端微被柔毛，可以区别。




图 会东堇花 *Wikstroemia huidongensis* C. Y. Chang
 1. 花枝; 2. 花外形 (放大); 3. 花面剖 (放大示雄蕊); 4. 花药 (放大);
 5. 子房 (放大示花盘鳞片)。 (吕发强绘)